

Patiënten informatie

Vorbereiding op de besnijdenis

- Er mag 2 uur voor de ingreep niets meer gegeten en gedronken worden.
- Een halfuur voor de ingreep kan Paracetamol genomen worden in een voor de leeftijd voorgeschreven dosering. Dit mag dus thuis doen of onderweg naar de kliniek genomen worden.
- Bij kinderen schrijven wij een Emla-crème recept uit. Dit mag u bij uw apotheek ophalen. Een halfuur voor de ingreep kan Emla-crème op de penis gesmeerd worden. De Emla-crème zorgt ervoor dat de door de anesthesiemedewerker toegediende plaatselijke verdovingsprikken minder steken.


Pijnbestrijding en verdoving

Het enige dat pijnlijk is bij de ingreep is de injectie voor de verdoving. Nadat deze prik is gegeven wordt binnen een kwartier de penis geheel gevoelloos. Wij gebruiken een hoogwaardig verdovingsmiddel dat een langere werkzame periode kent. De verdoving begint pas 12 tot 24 uur na de besnijdenis uit te werken. De ingreep is dan allang achter de rug. Hierna kan de penis nog gevoelig zijn, al valt dat meestal erg mee. Bij pijn kan Paracetamol gebruikt worden in een voor de leeftijd voorgeschreven dosering. Bij mannen en oudere kinderen wordt op verzoek een rustgevend middel toegediend. Dit zorgt ervoor dat de cliënt half slaapt waardoor de behandeling een beetje langs hem heen gaat.

De besnijdenis

De ingreep wordt uitgevoerd volgens de klassieke chirurgische methode. Allereerst wordt de penis verdoofd door middel van één of twee injecties.

Nadat gecontroleerd is of de verdoving goed werkt, wordt vervolgens de voorhuid losgemaakt van de eikel en weggeknipt. Tenslotte wordt de overgebleven huid met enkele oplosbare hechtingen vastgehecht vlak onder de rand van de eikel. De wond wordt na het verwijderen van de voorhuid met oplosbare hechtingen gesloten. De hechtingen zijn oplosbaar en verdwijnen vanzelf na 7 tot 21 dagen.



Afbeelding: besnijdenis volgens de klassieke chirurgische methode

Culturele beleving

SAM Besnijdenis Kliniek houdt rekening met de religieuze of culturele beleving. De cliënt kan in traditionele kleding worden besneden en er kan tijdens de ingreep worden gefotografeerd of gefilmd. Tijdens de behandeling zijn 2 personen in de behandelkamer toegestaan.

Toestemmingsverklaring

Bij kinderen moet er een toestemmingsverklaring door beide ouders getekend worden. Indien geen of maar 1 ouder tijdens de behandeling aanwezig is dan dient u een toestemmingsverklaring bij ons op te vragen en deze ondertekend mee te geven. Zonder toestemmingsverklaring van beide ouders kan de besnijdenis niet doorgaan. Bij specifieke situaties m.b.t. voogdij of één ouder gezinnen dient u dit op voorhand aan de Kliniek door te geven.

Klachtenregeling

De SAM Besnijdenis Kliniek heeft een klachtenregeling. Ouders of cliënten die ontevreden zijn over de dienstverlening van de SAM Besnijdenis Kliniek kunnen dat telefonisch melden of per e-mail (info@nummer1besnijdeniskliniek.nl). Zij krijgen dan het klachtenreglement toegestuurd.

Er zijn sinds de opening van de SAM Besnijdenis Kliniek geen klachten ingediend tegen een arts van de SAM Besnijdenis Kliniek.

Nazorg

Vaseline zalf

Na de besnijdenis wordt de eikel (penis) afgedekt met Vaseline zalf. Vervolgens wordt de eikel met een vetgaasje verbonden. Dit vetgaasje mag na 24 uur verwijderd worden. Indien het vergaasje al eerder los komt te zitten dan mag u het weggooien.

Vaseline geeft een goede wondbedekking en voorkomt dat de eikel of wond vast gaat plakken aan de onderbroek of luier. Wij raden u aan om gedurende 2 tot 3 weken bij elke ondergoed wissel of luierwissel een flinke hoeveelheid Vaselinezalf op de penis aan te brengen. Wanneer de laatste hechting is opgelost en de wond volledig is genezen mag u stoppen met Vaseline zalf.

U krijgt van ons een nieuwe tube vaseline mee die u dient te gebruiken. (Gelieve geen Vaseline te gebruiken van een geopende pot of tube om de infectiekans te minimaliseren)

Hygiëne

Houd de wond schoon om infectiekans te minimaliseren. Het is raadzaam om dagelijks in bad te gaan, echter niet langer dan een kwartier per dag. Als u geen bad heeft dan volstaat douchen. Geen badzout en zeep gebruiken. Na het badderen of douchen dient u de wond met vaseline insmeren. U kunt dit doen totdat de wond genezen is.

Niet zwemmen in een zwembad of zee. Dat vergroot de infectiekans.

Geel beslag op de eikel

Op de eikel kan een geel laagje ontstaan wat er soms wat vies uitziet. Het kan lijken op een velletje. Dit gele beslag verdwijnt vanzelf binnen een week door het baden.

Pijnstilling

Bij pijn mag u elke 6 uur Paracetamol gebruiken in de volgende dosering:

< 5 kg	1 zetpil paracetamol van 60 mg
5 – 7 kg	1 zetpil paracetamol van 120 mg
7 – 15 kg	1 zetpil paracetamol van 240 mg
15 – 30 kg	1 zetpil paracetamol (of tablet) van 500 mg
> 30 kg	1 tablet paracetamol van 1000 mg

Bij gebruik van rustgevend middel

Indien tijdens de besnijdenis een rustgevend middel is gebruikt zijn er extra voorzorgmaatregelen bij kinderen vereist. U dient het kind de eerste 4 uur goed te observeren en niet alleen te laten. Hij heeft nog niet de volledige controle over zijn (been)spiers waardoor er kans bestaat op vallen. Pas op met kleine snoepjes e.d.; hij zou zich kunnen verslikken. Uw kind kan vanwege het rustgevend middel erg onrustig zijn.

Losschieten van een hechting

Soms schiet een hechting voortijdig los. Dit is geen complicatie en vormt geen probleem. Indien u twijfelt mag u contact opnemen met de dienstdoende arts van de SAM Besnijdenis Kliniek.

Soms komt er weer wat bloedverlies als de hechtingen los gaan zitten na een dag of 10. Dat stopt weer vanzelf.

Mogelijke complicaties

Omdat onze chirurg zeer ervaren is treden complicaties maar zelden op. Indien er na een besnijdenis toch problemen zijn is het mogelijk om de eerste 24 uur dag en nacht contact op te nemen met de dienstdoende arts van de SAM Besnijdenis Kliniek. Indien nodig wordt de patiënt door deze arts teruggezien en behandeld.

Nabloeding

Na een besnijdenis kan een nabloeding optreden. Een beetje bloedverlies (klein bloedvlekje in luier of onderbroek) is normaal. Indien de wond echt gaat bloeden (zoals een druppelende kraan), dan moet contact worden opgenomen met de dienstdoende arts van de SAM Besnijdenis Kliniek. Telefoonnummer: 020-26 14 689 of 06-10 76 82 87.

Niet kunnen plassen

Soms hebben patiënten na de besnijdenis moeite met plassen. Als de patiënt 10 uur na de ingreep nog niet geplast heeft, moet contact worden opgenomen met de dienstdoende arts van de SAM Besnijdenis Kliniek. Telefoonnummer: 020-26 14 689 of 06-10 76 82 87.

Infectie

Enkele dagen na de ingreep gaat het wondje soms wat vocht produceren. Er ontstaat een klein blaasje wat er als uitstulping uit ziet. Dat is niet ongewoon en trekt binnen 2 weken volledig weg. Als de penis dik, rood en erg pijnlijk wordt, of de patiënt koorts krijgt, moet contact worden opgenomen met een arts. U kunt daarvoor de eigen huisarts consulteren of contact opnemen met de dienstdoende arts van de SAM Besnijdenis Kliniek. Telefoonnummer: 020-26 14 689 of 06-10 76 82 87.

Nacontrole

Twee dagen na de besnijdenis vindt er een telefonische nacontrole plaats. Een week na de behandeling vindt er bij bijzonderheden een nacontrole in de kliniek plaats.

Het telefoonnummer tijdens de eerste 24 uur:

06-10 76 82 87